



HAZIERA

LORAKETA

	Landaketaren iraupena asteetan	Argia/eguna orduetan	Buffer-agent ml /10 Litres	COGr Vega ml A /10 Litres ml B /10 Litres	COGr Flores RHIZOTONIC ml A /10 Litres ml B /10 Litres	CANNAZYM ml /10 Litres	CANNABOOST ml /10 Litres	PK 13/14 ml /10 Litres	EC + Ms/ zm3tan	EC Total Ms/ zm3tan	
ALDI BEGETATIBOA											
Hasiera/sustraipea - (3-5 egun) azpigeruza hezetu	<1	18	20	-	-	40	-	-	1,0	1,4	
Aldi begetatiboa I - Landarearen garapena bolumenaren arabera	0-3 ¹	18	-	25-35	-	20	25	-	0,9-1,3	1,3-1,7	
Aldi begetatiboa II - Fruitu edo lore kimuen produkzioaren ostean, hazia gelditu arte	2-4 ²	12	-	30-40	-	20	25	20 ⁵	-	1,2-1,6	1,6-2,0
HAZKUNDE ALDIA											
Hazkunde aldia I - Lore edo fruituaren garapena luzean. Haziera altueran etendua	2-3	12	-	-	35-45	5	25	20-40	-	1,4-1,8	1,8-2,2
Hazkunde aldia II - Fruitu edo lorearen garapena zabalera	1	12	-	-	35-45	5	25	20-40	15	1,5-1,9	1,9-2,3
Hazkunde aldia III - Fruitu edo lorearen garapena pisuaren arabera	2-3	12	-	-	30-40	5	25	20-40	-	1,1-1,5	1,5-1,9
Hazkunde aldia IV - Lore edo fruituaren heldutasun prozesua	1-2	10-12 ³	-	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0,0	0,4

1. Aldi hau landareen kopuru eta barietate metro karratuaren arabera aldatuko da. Ama-loreek fase honetan mantenduko dira bukaera arte (6-12 hilabete).
2. Arrazaren arabera, trantsizioa 18 ordufik 12ra aldatuko da. Eregelak empirikoa, 2 aste ondoren trantsizioa egitea da.
3. Heldutasuna arifegi izan ezker, argi orduak gutxitu. Airearen hezetasun erlatiboaren handitzearekin, kontuz ibili.
4. Sustratua bererabiltzen bada, Cannazymaren dosia 50ml/10Lra bikoiztu.
5. Estandarra 20 ml/10L. Loraketaren efektua indartzeko gehienez 40ml/10Lra handitu.

EC: EC+ balioa, ms/zmtan oinarritzen da, ura EC=0,0, 25^otan eta pha 6,0an dagonean. Ur aruntaren ECa gehitu, gomentatutako Eca. EC totala, adibidean EC 0,4ko ur aruntarekin.

Ph: Gomendatutako Pha, 5,5 eta 6,2 bitartekoa. Ph menosaren gehitzeak Eca 0, leian handitu dezake. Aldi begetatiboa, Ph menos crecimiento erabili, Pha murrizteko. Hazkunde aldian, Ph menos floracion erabili, Pha murrizteko.

Taulan agertutako norabideak, ez dira inolako legerik, baina kultibadore hasiberiei fertilizazio estrategiak garatzera lagun diezake. Fertilizazio estrategiak, horrelako faktoreak gutzaten dituzte: tenperatura, airearen hezetasuna, lore mota, e.a.

CANNA
The solution for growth and bloom