



	Landaketaren iraupena asteetan	Argia/eguna orduetan	Aqua Vega ml A /10 Litres ml B /10 Litres	Aqua Flores ml A /10 Litres ml B /10 Litres	RHIZOTONIC ml/ 10 Litres	CANNAZYM ml/ 10 Litres	CANNABOOST ml/ 10 Litres	PK 13/14 ml/ 10 Litres	EC + Ms/ zm3tan	EC Total Ms/ zm3tan	
ALDI BEGETATIBOA											
HAZIERA	Hasiera/sustraipea - (3-5 egun) azpigeruza hezetu	<1	18	15-25	-	40	-	-	0,7-1,1	1,1-1,5	
	Aldi begetatiboa I - Landarearen garapena bolumenaren arabera	0-3 ¹	18	20-30	-	20	25	-	0,9-1,3	1,3-1,7	
	Aldi begetatiboa II - Fruitu edo lore kimuen produkzioaren ostean, hazia gelditu arte	2-4 ²	12	25-35	-	20	25	20 ⁵	-	1,2-1,6	1,6-2,0
HAZKUNDE ALDIA											
LORAKETA	Hazkunde aldia I - Lore edo fruituaren garapena luzean. Haziera altueran etendua	2-3	12	-	30-40	5	25	20-40	-	1,4-1,8	1,8-2,2
	Hazkunde aldia II - Fruitu edo lorearen garapena zabaleran	1	12	-	30-40	5	25	20-40	15	1,6-2,0	2,0-2,4
	Hazkunde aldia III - Fruitu edo lorearen garapena pisuaren arabera	2-3	12	-	20-30	5	25	20-40	-	1,0-1,4	1,4-1,8
	Hazkunde aldia IV - Lore edo fruituaren heldutasun prozesua	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0,0	0,4

- Aldi hau landareen kopuru eta barietate metro karratuen arabera aldatuko da. Ama-loreek fase honetan mantenduko dira bukaera arte (6-12 hilabete).
- Arazaren arabera, trantsizioa 18 ordufik 12ra aldatuko da. Eregela enpirikoa, 2 aste ondoren trantsizioa egitea da.
- Heldutasuna ariñegi izan ezkeru, argi orduak gutxitu. Airearen hezetasun erlatiboaren handitzearekin, kontuz ibili.
- Sustratua bererabiltzen bada, Cannazymaren dosia 50ml/10Lra bikoiztu.
- Estandarra 20 ml/10L. Loraketaren efektua indartzeko gehienez 40ml/10Lra handitu.

EC: EC+ balioa, ms/zmtan oinarritzen da, ura EC=0,0, 25^otan eta pha 6,0an dagoenean. Ur aruntaren Eca gehitu, gomentatutako Eca. EC totala, adibidean EC 0,4ko ur aruntarekin.

Ph: Gomendatutako Pha, 5,2 eta 6,2 bitartekoa. Ph menosaren gehitzeak Eca 0,1ean handitu dezake. Aldi begetatiboa, Ph menos crecimiento erabili, Pha murritzeko. Hazkunde aldia, Ph menos floracion erabili, Pha murritzeko.

Taulan agertutako norabideak, ez dira inolako legerik, baina kullibadore hasiberriek fertilizazio estrategiak garatzera lagun diezake. Fertilizazio estrategiak, horrelako faktoreak mugatzen dituzte: temperatura, airearen hezetasuna, lore mota, e.a.

CANNA
The solution for growth and bloom