



	Landaketa- iraupena asteetan	Argia/eguna orduetan	COCO ml A /10 Litres ml B /10 Litres	RHIZOTONIC ml/ 10 Litres	CANNAZYM ml/ 10 Litres	CANNABOOST ml/ 10 Litres	PK 13/14 ml/ 10 Litres	EC + Ms/ zm3tan	EC Total Ms/ zm3tan	
<b>ALDI BEGETATIBOA</b>										
HAZIERA	<b>Hasiera/sustraipea</b> - (3-5 egun) azpigeruza hezetu	<1	18	15-25	40	-	-	-	0,7-1,1	1,1-1,5
	<b>Aldi begetatiboa I</b> - Landarearen garapena bolumenaren arabera	0-3 <sup>1</sup>	18	20-30	20	25	-	-	0,9-1,3	1,3-1,7
	<b>Aldi begetatiboa II</b> - Fruitu edo lore kimuen produktzioaren ostean, hazia gelditu arte	2-4 <sup>2</sup>	12	25-35	20	25	20 <sup>5</sup>	-	1,1-1,5	1,5-1,9
<b>HAZKUNDE ALDIA</b>										
LORAKETA	<b>Hazkunde aldia I</b> - Lore edo fruituaren garapena luzeeran. Haziera altueran etendua	2-3	12	30-40	5	25	20-40	-	1,4-1,8	1,8-2,2
	<b>Hazkunde aldia II</b> - Fruitu edo lorearen garapena zabaleran	1	12	30-40	5	25	20-40	15	1,6-2,0	2,0-2,4
	<b>Hazkunde aldia III</b> - Fruitu edo lorearen garapena pisuaren arabera	2-3	12	20-30	5	25	20-40	-	1,0-1,4	1,4-1,8
	<b>Hazkunde aldia IV</b> - Lore edo fruituaren heldutasun prosezua	1-2	10-12 <sup>3</sup>	-	-	25-50 <sup>4</sup>	20-40	-	0,0	0,4

1. Aldi hau landareen kopuru eta barietate metro karratuaren arabera aldatuko da. Ama-loreek fase honetan mantendu dira bukaera arte (6-12 hilabete).
2. Arrazaren arabera, trantsizioa 18 ordutik 12ra aldatuko da. Eregelak enpirikoak, 2 aste ondoren trantsizioa egitea da.
3. Heldutasuna arinegi izan ezker, argi orduak gutxitu. Airearen hezetasun erlatiboaren handitzearekin, kontuz ibili.
4. Sustratza bererabiltzen bada, Cannazymaren dosia 50ml/10Lra bikoiztu.
5. Estandarra 20 ml/10L. Loraketaren efektua indartzeko gehienez 40ml/10Lra handitu.

EC: EC+ balioa, ms/zmtan oinarritzen da, ura EC = 0,0, 25<sup>o</sup> tan eta pha 6,0 an doganean. Ur aruntaren ECa gehitu, gomentatutako Ecra. EC totala, adibidean EC 0,4ko ur aruntarekin.

Ph: Gomendatutako Pha, 5,5 eta 6,2 bitartekoa. Ph menosaren beharrezko Ec 0,1ean handitu dezake. Bai aldi begetatiboa zein hazkundera, Ph menos floracion erabilii behi.

Taulan agertutako norabideak, ez dira inolako legerik, baina kulltibadore hasiberrii fertilizazio estrategiak garatzera lagun diezakeie. Fertilizazio estrategiak, horrelako faktoreak mugatzen dituzte: tenperatura, airearen hezetasuna, lore mota, e.a.