



	Landaketaren irrapena asteetan	Argia/eguna orduelan	Hydro Vega ml A /10 Litres ml B /10 Litres	Hydro Flores ml A /10 Litres ml B /10 Litres	RHIZOTONIC ml/ 10 Litres	CANNAZYM ml/ 10 Litres	CANNABOOST ml/ 10 Litres	PK 13/14 ml/ 10 Litres	EC + Ms/ zm3tan	EC Total Ms/ zm3tan
ALDI BEGETATIBOA										
Hasiera/sustraipena - [3-5 egun] azpigeruza hezetu	<1	18	10-20	-	40	-	-	-	0,7-1,1	1,1-1,5
Aldi begetatiboa I - Landarearen garapena bolumenaren arabera	0-3 ¹	18	15-25	-	20	25	-	-	0,9-1,3	1,3-1,7
Aldi begetatiboa II - Frutu edo lore kimuen produkzioaren ostean, hazi geldituz arte	2-4 ²	12	20-30	-	20	25	20 ⁵	-	1,2-1,6	1,6-2,0
HAKKUNDE ALDIA										
Hakkunde aldia I - Lore edo fruituaren garapena luzearen. Haziera altueran etendua	2-3	12	-	25-35	5	25	20-40	-	1,4-1,8	1,8-2,2
Hakkunde aldia II - Frutu edo lorearen garapena zabaleran	1	12	-	25-35	5	25	20-40	15	1,5-1,9	1,9-2,3
Hakkunde aldia III - Frutu edo lorearen garapena pisuren arabera	2-3	12	-	15-25	5	25	20-40	-	1,0-1,4	1,4-1,8
Hakkunde aldia IV - Lore edo fuituaren heldutasun prozesua	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0,0	0,4

HAZIERA

LORAKETA

1. Aldi hau landareen kopuru eta barietate metro karratuaren arabera aldaturiko da. Ama-looreek fase honetan mantienduko dira bukaera arte (6-12 hilabete).
2. Arazaren arabera, trantsioa 18 orduetik 12ra aldaturiko da. Erregela enpirikoa, 2 asten ondoren trantsioa egitea da.
3. Heldutasuna arinlegi izan ezkerro, argi orduak gutxitu. Airearen hezetasun erlatiboaren handitzearekin, kontuz ibili.
4. Sustraiaren bererabilten bada, Cannazymaren dosia 50ml/10Lra bikoitztu.
5. Estandarra 20 ml/10L. Loraketaren efektua indartzeko gehienez 40ml/10Lra handitu.

EC: EC+ balioa, ms/zmtan oinarritzen da, ura EC=0,0, 25ºtan eta pha 6,0an dagoenean. Ur arruntaren ECa gehitu, gomentatutako Eca, EC totala, adibidean EC 0,4ko ur arruntarekin.

Ph: Gomendatutako Pha, 5,2 eta 6,2 bitartekoak. Ph menosaren gehitzeak Eca 0,1ean handitu dezake. Aldi begetatiboaan, Ph menos crecimiento erabilii, Pha murizteko. Hakkunde aldian, Ph menos floracion erabilii, Pha murizteko.

Taulan agertutako norabideak, ez dira inolako legerik, baita kultibadore hasiberriko fertilizazio estrategikoa garatzeari lagun diezaietik. Fertilizazio estrategikak, horrelako faktoreak mugatzent dituzte: temperatura, airearen hezetasuna, lore mota, e.a.