



CALENDARIO DE CULTIVO



GUÍA DE CULTIVO ONLINE

	FASE VEGETATIVA				FASE GENERATIVA						
	DESARROLLO DE LA RAÍZ		1		1		П	Ш	IV		
DÍAS Y SEMANAS	D1-5	D6-25	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	88	S9
HORAS DE LUZ	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Dosis en ml por 10L										
CANNA COGr VEGA A	38	38	43	43							
CANNA COGr VEGA B	38	38	43	43							
CANNA COGr FLORES A					36	36	36	36	32	32	
CANNA COGr FLORES B					36	36	36	36	32	32	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20	20	20 - 40 **	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
	m\$/cm										
EC AGUA***	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
EC NUTRIENTE	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,3 ****	1,6	1,6	
EC TOTAL	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7	1,8	1,8	0,4

Esta guía de cultivo está optimizada para plantas que desarrollan flores o frutos, a partir de un esqueje o plántula de una semana de edad. La duración de cada fase puede variar dependiendo de la variedad.

- Duplicar la dosis de CANNAZYM a 50 ml/10 L si el sustrato es reutilizado.
 Incremento de CANNABOOST hasta un máximo de 40 ml/10 L durante
- ** Incremento de CANNABOOST hasta un máximo de 40 ml/10 L durante la floración para obtener una potencia adicional.
- *** La dosis de CANNA CALMAG AGENT depende de la EC del agua, que idealmente debería ser de 0,2-0,4 m\$/cm. Si el agua inicial tiene una EC de 0,0, se puede aplicar Calmag en la dosis máxima para alcanzar una EC de 0,4 m\$/cm. Si la EC del agua inicialmente es superior a 0,0, se debe utilizar una dosis menor de Calmag. Este ejemplo de calendario asume una EC del agua (ajustada con Calmag) de 0,4 m\$/cm.
- **** EC incluye la dosis completa de CANNA PK 13/14 (15 ml/10 L).

Para una fase de crecimiento más larga, repetir la dosis recomendada desde desarrollo de la raíz período II (D6-25). Para una fase de floración más larga, repetir la dosis recomendada desde la fase generativa I (\$3-\$5).

Añadir CANNA PK 13/14 en el período 3-4 semanas antes de la cosecha.



