

CANNA HYDRO CALENDARIO DE CULTIVO **SOFT WATER**



CULTIVO

	FASE VEGETATIVA						FAS	GENERATIVA			
	DESARROLLO DE LA RAÍZ		1		1		П	Ш	IV		
DÍAS Y SEMANAS	D1-5	D6-25	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	S9
HORAS DE LUZ	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Dosis en ml por 10L										
CANNA HYDRO VEGA A (SW)	28	31	31	31							
CANNA HYDRO VEGA B (sw)	28	31	31	31							
CANNA HYDRO FLORES A (SW)					32	32	32	32	28	24	
CANNA HYDRO FLORES B (sw)					32	32	32	32	28	24	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20	20	20 - 40 **	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
CANNA FLUSH									40		40
	m\$/cm										
EC AGUA***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC NUTRIENTE	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2 ****	1,6	1,4	
EC TOTAL	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	1,8	1,6	0,2

Esta guía de cultivo está optimizada para plantas que desarrollan flores o frutos, a partir de un esqueje o plántula de una semana de edad. La duración de cada fase puede variar dependiendo de la variedad.

- Duplicar la dosis de CANNAZYM a 50 ml/10 L si el sustrato es reutilizado.
- ** Incremento de CANNABOOST hasta un máximo de 40 ml/10 L durante la floración para obtener una potencia adicional.
- *** La dosis de CANNA CALMAG AGENT depende de la EC del agua, que idealmente debería ser de 0,2-0,4 mS/cm. Si el agua inicial tiene una EC de 0,0, se puede aplicar Calmag en la dosis máxima para alcanzar una EC de 0,4 mS/cm. Si la EC del agua inicialmente es superior a 0,0, se debe utilizar una dosis menor de Calmag. Este ejemplo de calendario asume una EC del agua (ajustada con Calmag) de 0,2 mS/cm.
- **** EC incluye la dosis completa de CANNA PK 13/14 (15 ml/10 L).

Para una fase de crecimiento más larga, repetir la dosis recomendada desde desarrollo de la raíz período II (D6-25). Para una fase de floración más larga, repetir la dosis recomendada desde la fase generativa I (\$3-\$5). Añadir CANNA PK 13/14 en el período 3-4 semanas antes de la cosecha.



