

## CANNA COCO

## CALENDARIO DE CULTIVO



GUÍA DE CULTIVO ONLINE

	FASE VEGETATIVA				FASE GENERATIVA						
	DESARROLLO DE LA RAÍZ	I	II		I	II	III	IV			
<b>DÍAS Y SEMANAS</b>	D1-5	D6-25	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
<b>HORAS DE LUZ</b>	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Dosis en ml por 10 L</b>											
<b>CANNA COCO A</b>	29	29	33	33	33	33	33	33	29	29	
<b>CANNA COCO B</b>	29	29	33	33	33	33	33	33	29	29	
<b>CANNA RHIZOTONIC</b>	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
<b>CANNAZYM</b>		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
<b>CANNABOOST</b>			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
<b>CANNA PK 13/14</b>								15			
<b>CANNA CALMAG AGENT***</b>	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
<b>CANNA FLUSH</b>									40		40
<b>mS/cm</b>											
<b>EC AGUA***</b>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>EC NUTRIENTE</b>	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,3 ****	1,6	1,6	
<b>EC TOTAL</b>	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7	2,0	2,0	0,4

Esta guía de cultivo está optimizada para plantas que desarrollan flores o frutos, a partir de un esqueje o plántula de una semana de edad. La duración de cada fase puede variar dependiendo de la variedad.

- \* Duplicar la dosis de CANNAZYM a 50 ml/10 L si el sustrato es reutilizado.
- \*\* Incremento de CANNABOOST hasta un máximo de 40 ml/10 L durante la floración para obtener una potencia adicional.
- \*\*\* La dosis de CANNA CALMAG AGENT depende de la EC del agua, que idealmente debería ser de 0,2-0,4 mS/cm. Si el agua inicial tiene una EC de 0,0, se puede aplicar Calmag a la dosis máxima para alcanzar una EC de 0,4 mS/cm. Si la EC del agua inicialmente es superior a 0,0, se debe utilizar una dosis menor de Calmag. Este ejemplo de calendario presupone una EC del agua (ajustada con Calmag) de 0,4 mS/cm.

\*\*\*\* EC incluye la dosis completa de CANNA PK 13/14 (15 ml/10 L).

Para una fase de crecimiento más larga, repetir la dosis recomendada desde la fase vegetativa I (D6-D25). Para una fase de floración más larga, repetir la dosis recomendada desde la fase generativa I (S3-S5). Añadir CANNA PK 13/14 3-4 semanas antes de la cosecha.

